

TAKETIAM® 200 mg

(céfotiam hexétil)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

DENOMINATION

TAKETIAM 200 mg, comprimé pelliculé.

COMPOSITION QUALITATIVE

Chlorhydrate de céfotiam hexétil.

Alpha cyclodextrine, acide citrique anhydre, cellulose microcristalline, hydroxypropylcellulose, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, hypromellose, macrogol 6000, talc, oxyde de fer jaune (E 172), dioxyde de titane (E 171).

COMPOSITION QUANTITATIVE

Chlorhydrate de céfotiam hexétil
quantité correspondant à céfotiam : 200 mg pour un comprimé.

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé pelliculé.

Boîte de 10 comprimés.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTIBIOTIQUES DE LA FAMILLE DES BETA-LACTAMINES DU GROUPE DES CEPHALOSPORINES.

(J : anti-infectieux)

NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT

Laboratoires TAKEDA
15, quai de Dion-Bouton
92816 Puteaux Cedex

NOM ET ADRESSE DU FABRICANT

CATALENT FRANCE OSNY S.A.S.
17, rue de Pontoise
95520 Osny

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est un antibiotique de la famille des bêta-lactamines du groupe des céphalosporines.
Ce médicament est indiqué dans le traitement de certaines infections bactériennes à germes sensibles.

3. ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- allergie connue aux antibiotiques du groupe des céphalosporines,
- insuffisance rénale sévère,
- insuffisance du foie.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES

Toute manifestation allergique (éruptions cutanées, démangeaisons...) en cours de traitement doit être signalée immédiatement à votre médecin et imposer l'arrêt du traitement.
Il existe une possibilité d'allergie chez les sujets allergiques aux pénicillines.

Avant de prendre ce traitement, prévenez votre médecin si à l'occasion d'un traitement antibiotique antérieur vous avez présenté une réaction allergique : urticaire ou autres éruptions cutanées, démangeaisons, œdème de Quincke (brusque gonflement du visage et du cou d'origine allergique).

La survenue de diarrhées au cours d'un traitement antibiotique ne doit pas être traitée sans avis médical.

Ce médicament peut provoquer une fausse réaction positive de certains examens de laboratoire, notamment lors de la recherche de glucose dans les urines et lors d'un test de Coombs.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- prévenir votre médecin en cas de :
 - maladie rénale sévère,
 - prise d'un diurétique ou d'un antibiotique de la famille des aminosides.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

| | | |
|------------------------|--------------------|---|
| | | erstellt am: 24.04.2009 |
| | | Préparat: Taketiam 200 mg |
| Land: Frankreich | Mat-Nr.: 812608 | |
| Format: 148 x 210 mm | Schriftgröße: 7 pt | |
| Farben: blau Pant. 294 | | |
| Kunde: PenCef | Auftr.-Nr.: 454887 | |
| 2. Korrektur | | <input type="checkbox"/> druckreif <input type="checkbox"/> neuer Abzug |

BAT OK
G. BENAROUSSE
06/05/09

ou le 060509

GIAO NGUYEN THEVENET
Pharmacien Responsable Intérimaire

GROSSESSE - ALLAITEMENT

Grossesse

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Allaitement

L'allaitement est possible en cas de traitement par ce médicament. Toutefois, si des troubles digestifs (diarrhée, candidose) ou des éruptions cutanées apparaissent chez votre enfant, stoppez l'allaitement maternel ou la prise de médicament et consultez rapidement votre médecin.

D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT, DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MEDICAMENT.

4. COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

POSOLOGIE

Se conformer à l'ordonnance de votre médecin.

A titre indicatif, la posologie usuelle chez l'adulte est de 1 à 2 comprimés à 200 mg matin et soir, en fonction des indications.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

Les comprimés doivent être avalés avec un grand verre d'eau avant un repas afin d'éviter d'éventuelles manifestations digestives.

FREQUENCE ET MOMENT AUXQUELS LE MEDICAMENT DOIT ETRE ADMINISTRE

La dose journalière doit être répartie en deux prises à 12 heures d'intervalle, soit une prise le matin et une prise le soir.

DUREE DU TRAITEMENT

Pour être efficace, cet antibiotique doit être utilisé régulièrement aux doses prescrites, et aussi longtemps que votre médecin vous l'aura conseillé.

La disparition de la fièvre, ou de tout autre symptôme, ne signifie pas que vous êtes complètement guéri.

L'éventuelle impression de fatigue, n'est pas due au traitement antibiotique mais à l'infection elle-même. Le fait de réduire ou de suspendre votre traitement serait sans effet sur cette impression et retarderait votre guérison.

Cas particulier : la durée du traitement de certaines angines et de certaines sinusites est de 5 jours.

CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

Consultez votre médecin ou votre pharmacien.

CONDUITE A TENIR AU CAS OU L'ADMINISTRATION D'UNE OU PLUSIEURS DOSES A ETE OMISE

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

5. EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

- Manifestations sur la peau d'origine allergique,
- Manifestations digestives : nausées, vomissements, digestion difficile, diarrhée,
- Modifications passagères de la formule sanguine : augmentation de certains globules blancs (éosinophilie),
- Modifications des fonctions du foie : augmentation de certaines enzymes (ASAT, ALAT, phosphatases alcalines),
- Modifications des fonctions du rein : augmentation de la créatinine (mesure du fonctionnement des reins) ; altération du rein surtout en association avec les aminosides (antibiotiques) et les diurétiques.

SIGNEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

6. CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT EN CLAIR SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR

PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

Ce médicament doit être conservé à une température inférieure à 25°C et à l'abri de l'humidité.

7. DATE DE REVISION DE LA NOTICE

10.06.2008

8. CONSEILS / EDUCATION SANITAIRE

"Que signifie « aux antibiotiques » ?"

Les antibiotiques sont efficaces pour combattre les infections dues aux bactéries. Ils ne sont pas efficaces contre les infections dues aux virus. Aussi, votre médecin a choisi de vous prescrire cet antibiotique parce qu'il convient précisément à votre cas et à votre maladie actuelle. Les bactéries ont la capacité de survivre ou de se reproduire malgré l'action d'un antibiotique. Ce phénomène est appelé résistance : il rend certains traitements antibiotiques inactifs.

La résistance s'accroît par l'usage abusif ou inapproprié des antibiotiques.

Vous risquez de favoriser l'apparition de bactéries résistantes et donc de retarder votre guérison ou même de rendre inactif ce médicament, si vous ne respectez pas :

- la dose à prendre,
- les moments de prise,
- et la durée de traitement.

En conséquence, pour préserver l'efficacité de ce médicament :

- 1) N'utilisez un antibiotique que lorsque votre médecin vous l'a prescrit.
- 2) Respectez strictement votre ordonnance.
- 3) Ne réutilisez pas un antibiotique sans prescription médicale même si vous pensez combattre une maladie apparemment semblable.
- 4) Ne donnez jamais votre antibiotique à une autre personne, il n'est peut-être pas adapté à sa maladie.
- 5) Une fois votre traitement terminé, rappez à votre pharmacien toutes les boîtes entamées pour une destruction correcte et appropriée de ce médicament.

812608/09/05/48/E-03

06/05/09

GIAO NGUYEN THEVENET
Pharmacien Responsable Intérimaire

BAT OK
G. BENAROUSSE

06/05/09